



Géochimie des minéraux lourds, région de l'Estrie-Beauce, Québec (SNRC 21L/4,5,6,7)



Géochimie par: Yvon T. Maurice (1987)
Géologie (d'après P. St-Julien et A. Slivitzky, 1985)

1-Domaine des Nappes Externes: 1. Formation de Sainte-Hénédiène; Formations de Bulstrode et de Melbourne; Groupe de Saint-Roch; Formation de Lévis; Olistrome de la Rivière Etchemin; Groupe de Sillery

2-3 Domaines des Nappes Internes: 2. Groupe de Oak Hill
 2a. Formation de Tibbit Hill
 3. Shistes de Sutton-Bennet
 3a. Groupe de Rosaire
 3b. Dyke de Pennington (Serpentine)

4-5 Domaine Océanique (Bande de Serpentine): 4. Groupe de Caldwell; Formation de Saint-Daniel; Complexe Ophiolitique (volcanites)
 4a. Complexe Ophiolitique (serpentine, harzburgite et péridotite tectonique)
 5. Groupe de Magog (Formation de Saint-Victor; Formation de Beauceville; Formation d'Etchemin; Formation de Frontière)

6-Terrains Siluro-Dévonien: 6. Groupe de Saint-Francis

Cueillette des échantillons: Le groupe conseil GÉOREX, Sherbrooke, Québec

Analyses chimiques: Bondar-Clegg & Company Ltd. Ottawa, Ontario

Emplacement des échantillons

Sr (ppm)

