NOTICE

La carte Rivière Gatineau comprend une partie des provinces du lac Supérieur, du Sud et de Grenville dans le Bouclier canadien, et une partie de la plate-forme du Saint-Laurent et de l'orogène des Appalaches. Elle couvre une superficie d'environ 270,000 kilomètres carrés, soit 100,000 milles carrés. Le Bouclier canadien est constitué de roches ignées et métamorphiques archéennes, protérozoïques et paléozoïques. La plate-forme est couverte de roches sédimentaires peu déformées du Saint-Laurent, qui forment une plaine ondulée recouverte de dépôts récents, cultivés et habités, dont émergent des collines isolées qui représentent des pointements de socle et des intrusions Montérégiennes. Vers le sud-est, les basses-terres passent graduellement aux crêtes et aux vallées parallèles des Appalaches du Québec méridional.

Les roches précambriennes du Bouclier canadien occupent les trois quarts de la carte. Les plus anciennes, d'âge archéen, forment la zone de Pontiac de la province du lac Supérieur. Elles sont surtout d'origine sédimentaire, avec structures primaires bien préservées, ou d'origine plutonique, et possèdent des directions structurales sub-orientales, est-ouest. Des roches volcaniques peu abondantes ont livré du cuivre et de l'or. Elles sont recoupées par des granites et des roches basiques.

Dans la baie de Cobalt de la province du Sud, des roches clastiques de la fin de l'Archéen inférieur reposent en discordance sur des enclaves de roches volcaniques et de formation de fer archéennes. Les strates sont recoupées par des filons et des filons-couches de diabase de Nipissing et sont interrompues par des failles normales d'âges différents. On a trié de ces roches du fer, du cobalt et de l'argent. Elles sont peu déformées et ont été métamorphisées dans le faciès des schistes verts inférieur à moyen.

Dans la province de Grenville, les âges attribués aux roches sont peu sûrs et provisoires. Ils reposent sur quelques âges isotopiques et sur des caractères généraux d'ordre lithologique et structural. La province est formée de roches ignées et métamorphiques archéennes et protérozoïques qui ont subi un degré élevé de métamorphisme croissant produits durant l'orogénèse grenvillienne ou antérieurement. Le socle grenvillien déformé s'étend sous la plate-forme du Saint-Laurent et sous l'orogène appalachien. La région fournit du niobium, de l'uranium, de la magnésite, de la syénite néphélinique et du fer.

La plupart des gneiss de la zone de gneiss d'Ontario sont considérés comme les équivalents métamorphiques des roches sédimentaires et volcaniques archéennes. Ils sont surtout d'origine ignée, de composition hétérogène, roses ou gris, bien rubannés, et principalement dans le faciès amphibolite de métamorphisme, rarement dans le faciès granulite. De grandes régions sont occupées par des gneiss à faible pendage, de direction axiale variable et qui normalement plongent faiblement au sud-est. Il est possible que plusieurs épisodes de plissement soient représentés, mais le grain structural dominant est nord-ouest et est considéré d'âge grenvillien. Les roches de la zone de Pontiac sont, en général, plus jeunes que les gneiss environnants et sont bien liés et sont considérés d'âge archéen. Le faciès granulite est aussi plus courant. Ces roches possèdent des directions structurales est-ouest qui pourraient être métamorphiques. La zone métasédimentaire centrale de Grenville est d'âge protérozoïque supérieur et est considérée comme la partie la plus jeune de la province de Grenville qui est d'âge hélikien. Cette zone possède un grain structural grenvillien nord-est, fortement marqué. Le degré de métamorphisme varie du faciès des schistes verts supérieurs au faciès granulite, mais il est surtout dans le faciès amphibolite. Dans le bloc granulitique central on rencontre des paragneiss et des orthogneiss leucocrates et métamorphisés d'âge inconnu. Les directions structurales sont nord-sud ou moulent les intrusions. Les roches métasédimentaires et des Adirondacks qui sont peut-être plus jeunes que les intrusions environnantes typiques du Paléozoïque.

Les âges isotopiques varient entre 1000 m.a. et 1700 m.a. mais représentent probablement des âges métamorphiques. Les massifs granitiques sont rares, habituellement de petite taille. Des syénites néphéliniques se sont mises en place avant la fin du métamorphisme grenvillien, le long de la limite entre la zone de gneiss et la zone métasédimentaire centrale. Des monzonites quartzifères et des massifs minuscules alcalins se rencontrent surtout dans cette dernière zone.

Sur la plate-forme du Saint-Laurent, une couverture de couches horizontales qui s'amincissent vers le nord-ouest repose en discordance sur le socle grenvillien. Elle est constituée de roches du Cambrien et de l'Ordovicien. Dans la baie d'Ottawa et le bassin de Québec, des orthoquartzites cambro-ordoviciens de base, transgressifs au nord-ouest passent vers le haut aux carbonates de l'Ordovicien inférieur. Les carbonates de l'Ordovicien moyen qui les recouvrent en discordance sont surtout des schistes argileux et graveux noirs dont l'épaisseur augmente au sud-est, et par les couches rouges détritiques de Queenston, de l'Ordovicien supérieur, qui sont surtout dans le bassin de Québec. Les sédiments ordoviciens sont peu déformés et sont recoupés par des failles normales du système du fossé d'effondrement Ottawa-Bonnechère. Ces failles sont associées à la mise en place des diatrèmes alcalins des intrusions Montérégiennes.

Dans l'orogène appalachien une épaisse série de roches volcaniques, hadryniennes et de grauwacke en provenance du craton repose en discordance, dans l'anticlinorium du Green Mountain - monts Sutton sur un socle grenvillien. Ces roches sont recouvertes par des roches sédimentaires et carbonatées cambriennes et de l'Ordovicien inférieur qui les surmontent dans les synclinoriums situés au nord-ouest et passent vers le sud-est aux complexes ophiolitiques de la zone à serpentine et aux roches volcaniques acides et basiques de l'anticlinorium de Connecticut-Gaspé. Ces roches sont surtout d'âge ordovicien moyen et supérieur et passent vers le sud-ouest qui ne sont déposés sur une ceinture de craton déprimé et sur le fond de l'océan. Toutes ces roches ont subi des déformations multiples durant l'orogénèse taconique et ont été déplacées au nord-ouest. La région contient des gisements d'amiante, de talc, de cuivre et de zinc. Des schistes argileux et graveux synsinorogéniques, en provenance du sud-est et d'âge ordovicien moyen et supérieur forment la zone de Taconic et la zone de Connecticut-Gaspé. Ces roches sont surtout des couches allochtones, assemblées en lambeaux formant la zone synclinale des nappes.

Les roches de la zone à serpentine et de l'anticlinorium de Stoke Mountain sont recouvertes en discordance par des roches du Cambrien supérieur et de l'Ordovicien inférieur. Elles sont surtout d'âge ordovicien moyen et supérieur qui forment le synclinorium de Saint-Victor-Tring-Sutton et le synclinorium de Connecticut-Gaspé, le plus profond de schistes gréseux et de calcaires volcaniés et de roches volcaniques de Connecticut-Gaspé, le plus ancien qui est en contact avec elles par failles. Durant l'orogénèse acadienne du Devonien, le synclinorium et une partie de l'anticlinorium des Green Mountain - monts Sutton ont été déformés en plis déversés vers le nord-ouest et recoupés par des intrusions granitiques du Devonien. Le métamorphisme régional acadien a atteint son maximum du Vermont et du Nouveau Hampshire, de faciès de basse pression, à andalousite, passe vers le sud au faciès de pression intermédiaire, à disthène.

PROVINCES GÉOLOGIQUES



Limite de province .....
Limite de sous-province .....

ZVA ..... *Zone volcanique d'Abitibi*
ZPG ..... *Zone de Pontiac-Grenville*
AMB ..... *Anticlinorium du mont Boundary*
SC-G ..... *Synclinorium de Connecticut-Gaspé*
AGM-MS ..... *Anticlinorium des Green Mountain-monts Sutton*
SH ..... *Synclinorium d'Hinesburg*
LL ..... *Ligne de Logan*
SM ..... *Synclinorium de Middlebury*
SSA ..... *Synclinorium de Saint-Albert*
ZS ..... *Zone de serpentine*
ASM ..... *Anticlinorium de Stoke Mountain*
SSV ..... *Synclinorium de Saint-Victor*
ZNT ..... *Zone de nappes du Taconique*
ZCT ..... *Zone de charriages du Taconique*

Contact géologique (observé, présumé) .....
Faille (observée, présumée) .....
Faille normale (hachures indiquant le toit) .....
Chevauchement, faille inverse (dents indiquant le toit, observé, présumé) .....
Direction .....
Anticlinal .....
Synclinal .....
Anticlinal et synclinal (plil déversé) .....
Isograde,
biotite .....
grenat .....
disthène .....
sillimanite .....
staurotide-disthène .....
staurotide-andalousite .....
Carbonatite .....
Lieu de la datation isotopique
par le CGC MC79
par d'autres laboratoires MC79b
Roches ignées, roches métamorphiques ..... O, ⊙
Dyke: gabbro, de diabase (direction indiquée par le trait) .....
Pegmatite .....
Méthodes :
Potassium-argon, rubidium-strontium (λ = 1.42), uranium-thorium-plomb ..... KRS
Minéraux :
biotite ..... b *phlogopite* ..... p *isochrone de roche entière* I
hornblende ..... h *amphibole* ..... a *pinson* ..... z
muscovite ..... m *roche entière* ..... r *uraninite* ..... u
Âge en millions d'années 375
Échantillon: surface, profondeur, filons-couches ou couvées 374, 374, 374
Noms des autres laboratoires
Université Carleton C
Université McGill ..... Y
Université de Toronto ..... T
United States Geological Survey-Denver ..... W
United States Geological Survey-Washington ..... W
California Institute of Technology ..... W
Carnegie Institution of Washington ..... W
Lamont Geological Observatory ..... W
Massachusetts Institute of Technology ..... W
Le laboratoire de Clermont-Ferrand, France ..... CA

Données géologiques compilées par A.J. Baer, W.H. Poole et B.V. Sanford, 1971

Les données géologiques du Bouclier canadien ont été compilées par A.J. Baer, celles de l'orogène des Appalaches par W.H. Poole et celles de la plate-forme du Saint-Laurent par B.V. Sanford à partir de cartes publiées et inédites de la Commission géologique du Canada, du ministère des Richesses naturelles du Québec, de la Division des mines de l'Ontario et de la Survey géologique de l'État de New York, du Vermont et du New Hampshire.
Ont contribué à la compilation M. Kasvinsky, M. Gay, D. Hood, J.E. Dubeyl, F. St-Julien et J.B. Thompson; à la géologie du Bouclier, Y.W. Isachsen, S.B. Lumbers, M. Rive et J. Rondot. Les données géologiques autres que celles déjà cartographiées ont été fournies par A.J. Baer à la suite de levés géologiques, 1968-1970.

La cartographie géologique a été réalisée par J.A.R. Sauvageau et Y.F. St. Pierre Savard de la Commission géologique du Canada

L'information géologique portée sur cette carte a été obtenue au moyen des techniques de la cartographie automatisée et de la cartographie traditionnelle. Les hachures, les failles, les plis et les isogrades ont été convertis en numérique par la Section de cartographie automatisée de la Commission géologique du Canada

Grâce à une entente de collaboration, le personnel de la Commission géologique du Canada a utilisé les services de traitement et de restitution des données de la Section de cartographie automatisée de la Direction des levés et de la cartographie pour produire les fichiers de restitution et le matériel de reproduction destiné à la lithographie.

La généralisation et l'assemblage de la carte de base ont été réalisés par la Commission géologique du Canada à partir des cartes IMW-NL-17 et NL-18 publiées à la même échelle par la Direction des levés et de la cartographie en 1970 et 1964 respectivement. Les routes ont été généralisées par la Commission géologique du Canada

This map has been produced from a scanned version of the original map
Reproduction par numérisation d'une carte sur papier

COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES

80°
79°
78°
77°
76°
75°
74°
73°
72°
48°
47°
46°
45°
44°
NORTH BAY
Lake Nipissing
SUDBURY
Lake Huron
Georgian Bay
Lake Simcoe
OTTAWA
PETERBOROUGH
KINGSTON
BELLEVILLE
BARRIE
ORILLIA
COBOURG
PORT HOPE
OSHAWA
TORONTO
BRAMPTON
MISSISSAUGA
HAMILTON
KITCHENER
GUELPH
CAMBRIDGE
BRANTFORD
LONDON
WOODSTOCK
STRATFORD
SARNIA
Lake Erie
Lake Ontario
Lake Saint-Pierre
Lac Saint-Louis
Lac Témiscamingue
Lac Nipissing
Lac Simcoe
Lac Ontario
Ottawa River
Rideau River
Gatineau River
Mississippi River
Trent River
Grand River
Thames River
Niagara River
Welland Canal
Rideau Canal
Trent Canal
Lachine Canal
Soulanges Canal
Beauharnois Canal
Welland Canal
CANADA
U.S.A.
Arch
Ag
Ah
Ab
Ahl
Ahn
Ahb
Anqf
Anqr
Anqb
Anb
Anh
Anqh
Anb-gh
Anh-gh
Anh-b
Anh-h
Anh-qf
Anh-qr
Anh-qb
Anq-gh
Anq-b
Anq-h
Anq-qf
Anq-qr
Anq-qb
Anb-gh
Anb-h
Anb-qf
Anb-qr
Anb-qb
Anh-gh
Anh-b
Anh-h
Anh-qf
Anh-qr
Anh-qb
Anqf
Anqr
Anq