Ressources naturelles Canada | Natural Resources Canada

COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA | GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA

LA GÉOLOGIE DU SUBSTRATUM ROCHEUX



Figure 6. Géologie simplifiée du substratum rocheux de la région cartographique de Lac Castagnier. Adapté d'Avramtchev et Lebel-Drolet (1981), Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec–Ontario Geological Survey (1983) et Hocq (1989).

LITHOLOGIE

Les unités des formations en surface qui composent la présente série s'insèrent dans le sous-province de l'Abitibi, une composante de la Province du Supérieur du Bouclier canadien, laquelle forme la plus grande étendue de granite et de roches vertes au monde. Presque tout le socle de l'Abitibi date de la période de 2 750 à 2 670 millions d'années (Ma) de l'Archéen (Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec–Ontario Geological Survey, 1983), les éléments structuraux de la carte tridirectionnelle du substratum rocheux de la région cartographique de Lac Lebel-Drolet (1981). Des roches volcaniques mafiques basaltiques et filons-couches gabbroïques unit ti constituent la lithologie la plus commune de la région occupant plus de la moitié de la superficie. Cette unité, dont la répartition couvre environ la moitié de la carte, se compose de coulées de lave en coussins et massives, de brèches et de formes de bandes alternatives du nord-ouest au sud-est. Des brèches de roches volcaniques felsiques (unité 2), d'orientation semblable, s'insèrent dans la succession de roches volcaniques mafiques dans la région de La Morandière et des bandes de granocrate, de granodiorite et de tonalite (unité 3) de forme irrégulière peuvent y être observées un peu partout dans l'ensemble de la carte. Les roches intrusives mafiques-ultramafiques (gabbro et péridotite, unité 4) occupent environ 5 % de la région, principalement sur une très faible superficie de la région cartographique. Les gneiss et granitoïdes gneissiques (unités 6 et 7) occupent une grande partie de la région et forment une large bande également orientée nord-ouest–sud-est. Des intrusions massives (granite et granodiorite, unité 8) de forme irrégulière, de petite dimension, occupent les environs de Saint-Maurice-de-Dalquier et de Beattyville. Des dykes de diabase d'âge protérozoïque, d'orientation générale nord-est–sud-ouest, recoupent, à peu près à angle droit, les roches archéennes et les systèmes de failles illustrés sur la carte de Lac Castagnier.

PROTÉROZOÏQUE
- 9 — Dykes de diabase

ARCHÉEN
- 8 — Granite, syénite et monzonite massifs
- 7 — Grenodiorite, tonalite et trondhjémite gneissiques
- 6 — Gneiss, migmatites
- 5 — Roches intrusives ultramafiques-mafiques: gabbro, diorite
- 4 — Roches sédimentaires: grauwacke, siltstone, argile
- 3 — Roches volcaniques felsiques
- 2 — Roches volcaniques mafiques : basalte, filons-couches gabbroïques
- 1 — Faille
- Chemin de fer

SIGNATURE MAGNÉTIQUE

L'épaisse couverture de sédiments argileux présente dans une grande partie de l'Abitibi associe à faible contraste avec le substratum rocheux avec précision. Dans ces régions à faible affleurement rocheux, on peut déduire la géologie à partir des résultats de levés aéromagnétiques pour lesquels des données acquises par forage et par observation directe, qui se rapportent à la géologie du substratum rocheux en profondeur, sont présentant une forte susceptibilité magnétique resortent également. Les données aéromagnétiques de la région révèlent plusieurs structures, telles que des variations de l'intensité magnétique et du caractère de ceux-ci. On a choisi de représenter la carte magnétique à l'aide d'une ombre oblique, ce qui met en évidence les détails de faible amplitude. Le total de l'intensité magnétique (fig. 7), laquelle permet la mise en évidence des sources magnétiques de faible profondeur, a été utilisé pour la carte de surface. Ainsi, on observe que des failles, des plissements et des dykes de diabase et les formations de fer ressortent généralement de façon très nette. Les roches qui ont une faible susceptibilité, comme des sédiments meubles, y sont en relation d'une formation en milieu subaquatique et du remaniement des sédiments qui les composent par les eaux du Lac Ojibway.

Les dépôts de sable et de gravier ont été déposés et modifiés d'abord par les eaux du Lac Ojibway et, plus tard, par des processus postglaciaires comme ceux liés à l'action du vent. Eskers et moraines (unités 2a, 2b) ont été la source de matériaux granulaires, du sable surtout, des sédiments subfluviaux et des sédiments de plage (unité 3b) mis en place lors de la baisse des eaux du lac proglaciaires. Dans les eskers et les moraines, ces sédiments sont généralement bien triés et ne contiennent que peu de matière fine. Les dépôts d'eskers abondent, avec la Moraine d'Harricana en position médiane, jouer un rôle important dans la vie économique de la région. Grâce aux eaux souterraines qu'ils contiennent, les dépôts granulaires sont une source d'approvisionnement en eau potable. En outre, ils constituent une source d'agrégats pour la construction et servent de fondation à l'infrastructure routière. Ceux situés à l'ouest du complexe interlobaire de la Moraine d'Harricana sont les plus volumineux de la région. La région couverte par les cartes de Cadillac, de Lac Chicobi, de Rivière Wawagosic et de Rivière Harricana, contient la plus forte concentration de dépôts granulaires.

Figure 1. Tourbière en lanières du nord de l'Abitibi (unité 6). Photo: GSC 2000-043-C

Figure 2. Mince couche (2 m) de till argileux (unité 4, partie foncée sommitale) dans le volcanage de la mine Casa Berardi, mis en place lors de crues glaciaires. Les sédiments fluvioglaciaires (unité 2b) sous-jacents ont été tronqués par l'érosion avant le dépôt du till. Photo: GSC 2000-043-E

Figure 3. Coupe d'argile (unité 3a) des environs d'Amos; les couches horizontales ou légèrement inclinées sont des varves, le type de dépôts glaciolacustres le plus répandu de la région. Photo : GSC 2000-043-D

Figure 4. Coupe dans un esker (unité 2b) du nord de l'Abitibi; les variations abruptes de granulométrie et les indices d'érosion des strates plus anciennes avant le dépôt à angle des couches plus récentes sont caractéristiques des eskers. Photo : GSC 2000-043-I



Figure 5. Coupe dans une forte fusolée de till caillouteux et sableux, à granulométrie variable (unité 1a). Les blocs de roches cristallines du Précambrien (unité 1b). Photo : GSC 2000-043-J

LES ÉCOULEMENTS GLACIAIRES



Figure 8. La séquence des écoulements glaciaires en Abitibi.

DES GLACIERS QUI ÉRODENT

Au cours des deux derniers millions d'années, plusieurs glaciations ont façonné le relief de la région. Les glaciers ont arraché des débris au substratum rocheux; ces débris, allant de l'argile à des blocs de plusieurs mètres de diamètre, sédiments, L'empreinte glaciaire la plus distinctive de la région est celle qui a laissée le dernier glacier, disparu de la région il y a environ 8 000 ans. Les preuves de son passage sont lisibles non seulement par les sédiments meubles déposés lors de la fonte des glaces, mais aussi par les marques de rabotage et de polissage, les stries glaciaires et les formes de relief allongées qu'ont laissé les glaciations antérieures. Les stries glaciaires de la sous-province de l'Abitibi ont en effet conservé un excellent registre des marques et des stries laissées par les glaciers. Par endroits, elles portent des stries qui se recoupent, indiquant avec des changements de direction dans le mouvement des glaces au cours des temps. Les stries glaciaires ont été utilisées par Veillette (1995) pour définir différentes étapes d'écoulement glaciaire à l'aide, mais ils ont aussi pu varier autant en direction qu'en durée au cours d'une même glaciation. La recherche et le levé de stries glaciaires ont été entreprises dans le cadre de la présente série. Par ordre de formation, un travail exigeant fortement sur plusieurs années, a permis de reconstituer la séquence des écoulements glaciaires qui est illustrée à la figure 8. Les travaux d'exploration minière fondés sur l'échantillonnage des sédiments glaciaires doivent donc tenir compte de la complexité des écoulements glaciaires. Ainsi, dans la région de Lac Matagami, la présence de blocs de cuivre-zinc bouchée par une valeur de sédiments-, lesquels ont été incorporés dans la partie supérieure des argiles (unité 3a). Elle occupe la totalité des cartes de Rivière Harricana, de Lac Matagami, de Rivière Waswanipi et de Rapide-des-Cèdres et la plus ouest partie de Rivière Wawagosic. Schématisation des stries d'ordre 1 et 2 et des erratiques glaciels indiquant que, à la déglaciation, les vents dominants en été soufflaient du nord-ouest vers le sud-est.

LA SÉQUENCE DES ÉCOULEMENTS GLACIAIRES

L'ordre de superposition des flèches à la figure 8 indique la suite chronologique des écoulements glaciaires reconstruite par Veillette (1995). Les stries de la sous-province de l'Abitibi observées au cours de ces travaux (Veillette, 1986, 1989, 1995, 1996, 1997a, 1997b) confirment, dans l'ensemble, les stades définis par Veillette (1995). Les stries les plus anciennes, qui ont été observées sur quelques affleurements isolés, ont été attribuées à l'écoulement n° 1. Cet écoulement pourrait dater d'une glaciation antérieure, il se manifeste par des stries d'orientation variable, qui ont été observées dans quelques basses terres de la baie James et de la baie d'Hudson dans les sédiments glaciaires situés à la base de quelques forages profonds (Veillette et al., 1988). Un écoulement subséquent vers le nord-ouest (écoulement n° 2), formé probablement lorsque les glaces ont envahi la région au début de la dernière glaciation, a été observé dans la région cartographique de Lac Castagnier et dans les environs de Cadillac (Bostock, 1972) à l'aide de nombreuses marques sur roc nord de l'axe Joutel-Desmaraisville. Celle-ci sont recoupées par d'autres marques glaciaires, qui indiquent que les glaces ont ensuite suivi un axe nord-sud (écoulement n° 3) (Veillette et al., 1996). Lors de la déglaciation, le glacier s'est scindé en deux lobes le long d'une ouverture dont la trace est révélée dans le paysage actuel par la dépression occupée par le lac Matagami (orienté nord-ouest–sud-est dans la majeure partie de l'Abitibi, la Moraine d'Harricana (Prest et al., 1968; Hocq, 1994; Veillette, 1994). Les stries des écoulements n° 4 et 5 observées dans la région cartographique, se dirigent vers le sudest à l'ouest du complexe interlobaire et vers le sud-ouest à l'est de celui-ci (écoulement n° 4), Enfin, avant la disparition définitive des glaces, il est produit un phénomène local de récurrence glaciaire (les crues de Cochrane). Les glaces se sont alors écoulées vers le nord-ouest (écoulement n° 5) (Veillette, 1997a). Les sédiments déposés par ces écoulements récents mêle sur le substratum rocheux et les dépôts d'argile du nord de l'Abitibi,

LES ÉCOULEMENTS GLACIAIRES DANS LA RÉGION CARTOGRAPHIQUE DE LAC CASTAGNIER

Des écoulements glaciaires convergents vers le Moraine d'Harricana (écoulements n° 4 et 5) ont été observés dans la région de Lac Castagnier et au sud-est de celle-ci. Ces écoulements s'inscrivent dans la déglaciation de la région cartographique de Lac Castagnier. L'écoulement antérieur (n° 3) était axial dirigé vers le sud-ouest dans la majeure partie de la région cartographique, où qui, de ce fait, rend difficile sa distinction de l'écoulement convergent (n° 4) à direction semblable. Les stries de l'écoulement n° 3 ont été notées à 11 sites, le long de la partie moins nord-ouest de la carte, apparaît sur les photographies aériennes parce qu'il ressort de la plaine glaciolacustre. L'interprétation des photographies aériennes a également révélé la présence de dépôts d'argile, d'en affleure, lorsque couvert-atteignent de fortes épaisseurs, comme c'est le cas à certains endroits en Abitibi, leur présence nuit à l'interprétation des signaux électromagnétiques de provenance du substratum rocheux. En raison de leur fine granulométrie, ces dépôts argileux sont également susceptibles de produits par des roches conductrices dans le substratum rocheux, comme celles qui renferment des sulfures massifs, et, par conséquent, diminuent l'efficacité des levés électromagnétiques



Figure 9. Surface striée révélant une seule orientation d'écoulement glaciaire, GSC 2004-070

LES MARQUES D'ÉCOULEMENT GLACIAIRE

Il s'agit ici de marques laissées sur le substratum rocheux par l'action érosive des glaces. Elles sont de deux types : les stries glaciaires et les marques en forme de virgule. Ce sont les surfaces rocheuses résultant de la pression d'outils rocheux emprisonnés dans les couches basales des glaciers en mouvement et traînés sur le substratum rocheux. Les stries glaciaires nous renseignent fournir les indications nécessaires à établir le sens du mouvement du glacier qui les a produites.

Les stries glaciaires qui révèlent une seule orientation d'écoulement glaciaire ou plus

La présence de deux générations de stries ou plus sur un même affleurement, ordonnées dans une séquence chronologique distincte, avec les plus jeunes superposées aux plus anciennes, constitue un indice fiable de changements survenus à l'axe de l'écoulement glaciaire (ou par rapport aux écoulements subséquents), fournit des données ponctuelles quant au changement de direction de l'écoulement des glaces. Les affleurements qui comportent des surfaces sur lesquelles peuvent être identifiées des stries glaciaires de plus d'une génération sont relativement rares. Les stries de surfaces striées ne réfléchissent qu'une seule orientation d'écoulement. Une microphotographie favorable à l'échelle des affleurements rocheux est présentée à la figure 9. Les stries glaciaires sont des indicateurs directionnels. Les relations qui existent entre les surfaces portueuses de stries d'orientations variées sur un même affleurement nous permettent de déterminer l'ordre de formation de ces stries et, par conséquent les résultats de plusieurs affleurements. Ce type, il est alors possible de reconstituer la séquence des écoulements glaciaires qui ont affecté une région donnée. Les stries de la première génération formées d'orientation et de décrire les affleurements rocheux dont elles portent les stries, puis de reporter ces données sur carte. Ces levés exigent un travail minutieux de recherche et le tenter et ont été jusqu'à présent rapportent que une grande partie du nord-ouest québécois et du nord-est ontarien (Veillette et McClenaghan, 1990).

Dans la région cartographique de Lac Castagnier, les surfaces striées révélant deux orientations d'écoulement glaciaire sont nombreuses. Elles sont généralement planes et eaux plus jeunes ont toujours été dirigés vers le sud-ouest, C'est pourquoi l'exemple utilisé à la figure 10 est tiré d'un secteur situé à l'ouest de la région cartographique, où qui, de ce fait, rend difficile sa distinction de l'écoulement convergent (n° 3) était aussi dirigé vers le sud-ouest dans la région cartographique, où qui, de ce fait, rend difficile sa distinction de l'écoulement convergent (n° 4) à direction semblable. Les stries de l'écoulement n° 3 ont été notées à 11 sites, le long de la partie moins nord-ouest de la carte, apparaît sur les photographies aériennes parce qu'il ressort de la plaine glaciolacustre. L'interprétation des photographies aériennes a également révélé la présence de dépôts d'argile, d'en affleure, lorsque couvert-atteignent de fortes épaisseurs, comme c'est le cas à certains endroits en Abitibi, leur présence nuit à l'interprétation des signaux électromagnétiques de provenance du substratum rocheux. En raison de leur fine granulométrie, ces dépôts argileux sont également susceptibles de produits par des roches conductrices dans le substratum rocheux, comme celles qui renferment des sulfures massifs, et, par conséquent, diminuent l'efficacité des levés électromagnétiques

Figure 10. Recoupement de surfaces striées révélant deux orientations d'écoulement glaciaires. Photo: GSC 2000D41

LE TRANSPORT GLACIAIRE



Figure 11. Le transport glaciaire en Abitibi. **A)** Aires de répartition des erratiques de lithologies caractéristiques. **B)** Dispersion des erratiques de lithologies caractéristiques à partir des régions sources. **C)** Abondance relative des erratiques en fonction de l'éloignement de la source.

UN GLACIER QUI TRANSPORTE DES MATÉRIAUX

Le glacier prend en charge des débris rocheux, graviers, grave, sable et argile. Lorsque ces matériaux proviennent de lithologies facilement reconnaissables, ils peuvent servir de traceurs pour déterminer la direction générale que le glacier a emprunté. On trouve au nord-ouest et au nord-est de l'Abitibi (fig. 11 A et B) de telles lithologies contenant des débris de roches volcaniques felsiques et mafiques, de granite et de gneiss provenant du substratum rocheux. Les erratiques proviennent du nord-ouest, qui nous renseignent sur les écoulements n° 4 et n° 5, sont constitués de roches carbonatées du Paléozoïque de la Plate-forme d'Hudson ainsi que de roches sédimentaires du Protérozoïque de la région de Mistassini, au Québec, et de la baie d'Hudson. Les erratiques en provenance du nord-est, formés d'une variété de roches sédimentaires (dolomie, conglomérat, argilite et quartzite du Protérozoïque), de basalte (Mueller, 1970; Beaudry, 1994), sont utilisés pour l'étude des écoulements n° 3 et n° 4. Ces erratiques de provenance septentrionale ont été utilisés pour déterminer la direction de la séquence des écoulements glaciaires révélés par l'examen des stries et d'abonner des modèles régionaux du transport glaciaire. A une échelle plus locale, les blocs erratiques de lithologies facilement reconnaissables, comme chimiques, minéraux bruités ou fragments de lithologies caractéristiques, ont été utilisés par Veillette et al. (1996) pour déterminer la direction et la localisation de la source de quelques minéralisations peuvent mener à la découverte de gisements. Ainsi, dans la région de Lac Matagami (Hannon et Henry, 1987; Veillette et al., 1995), une attention spéciale a été accordée à la dispersion des blocs de sulfures massifs riches en cuivre-zinc. Plusieurs gisements ont été découverts à la suite de prospections effectuées en raison de leur intérêt comme traceurs, mais aussi à cause de leur pouvoir lampon à l'égard des prospecteurs riches, L'utilisation de sédiments carbonatés à grain fin dans l'atténuation des effets des niveaux miniers de la région de Lac Matagami a été étudiée par Veillette et Cloutier (1993) et en Abitibi (D. Bouchard, Géologica Inc., rapport inédit préparé à l'intention de Minéraux Noranda, Division Matagami, 1992; Veillette et al., 1996).

Un écoulement subséquent vers le nord-ouest (écoulement n° 2), formé probablement lorsque les glaces ont envahi la région au début de la dernière glaciation, a été observé dans la région cartographique de Lac Castagnier et dans les environs de Cadillac (Bostock, 1972) à l'aide de nombreuses marques sur roc nord de l'axe Joutel-Desmaraisville. Celle-ci sont recoupées par d'autres marques glaciaires, qui indiquent que les glaces ont ensuite suivi un axe nord-sud (écoulement n° 3) (Veillette et al., 1996). Lors de la déglaciation, le glacier s'est scindé en deux lobes le long d'une ouverture dont la trace est révélée dans le paysage actuel par la dépression occupée par le lac Matagami (orienté nord-ouest–sud-est dans la majeure partie de l'Abitibi, la Moraine d'Harricana (Prest et al., 1968; Hocq, 1994; Veillette, 1994). Les stries des écoulements n° 4 et n° 5 observées dans la région cartographique, se dirigent vers le sud-est à l'ouest du complexe interlobaire et vers le sud-ouest à l'est de celui-ci (écoulement n° 4), Enfin, avant la disparition définitive des glaces, il est produit un phénomène local de récurrence glaciaire (les crues de Cochrane). Les glaces se sont alors écoulées vers le nord-ouest (écoulement n° 5) (Veillette, 1997a). Les sédiments déposés par ces écoulements récents mêle sur le substratum rocheux et les dépôts d'argile du nord de l'Abitibi,

LES TRAÎNÉES DE DISPERSION GLACIAIRE

La courbe de dispersion glaciaire est définie par la limite de till en fonction de la distance à partir du contact distal des roches source est l'outil le plus important pour la mise en évidence de traînées de dispersion glaciaire. Les traînées de dispersion glaciaire sont définies par la limite de till en fonction de la distance à partir du contact distal des roches source. Dans cette photo, deux générations de stries sont nettement distinctes sur un affleurement de roches volcaniques felsiques situé sur les rives du lac Macarisy; les stries d'un premier écoulement (n° 3) vers 240° sur un plan incliné (derrière la personne) sont recoupées par des stries d'un deuxième écoulement (n° 4) vers 210°. Les couches sont composées à partir de roches cristallines du Précambrien et des roches sédimentaires du Paléozoïque de la Plate-forme d'Hudson. Le figure 12 hot un un bloc erratique de calcaire fossilifère du Paléozoïque d'environ 50 cm de diamètre. Photo: GSC 2004-069



Les blocs erratiques suivent parfois un long parcours comme l'illustre un gros bloc de granodiorite protérozoïque provenant du sud-est de la baie d'Hudson (Prest, 1980; Prest et Hamilton, 1987), que l'on a trouvé dans la région du lac Tabo, au nord de la région cartographique de Lac Castagnier (fig.13). Ce bloc, qui mesure environ 3 m de diamètre, a été transporté par le glacier sur une distance de 1 000 km. Ce bloc a probablement été transporté vers le sud-est par le glacier, remis en circulation vers l'est par le glacier, puis déposé à sa position actuelle par le glacier du lac Ojibway, qui a coulé dans la région vers le nord-ouest. Les blocs erratiques peuvent également servir à déterminer la direction générale du transport glaciaire, comme nous en fournissent les stries ou les formes profilées.

LE TRANSPORT GLACIAIRE DANS LA RÉGION CARTOGRAPHIQUE DE LAC CASTAGNIER

La répartition des traceurs lithologiques qui nous renseignent sur la direction générale du transport glaciaire dans la région cartographique de Lac Castagnier est illustrée à la figure 11 A. Il était donc possible de reconstituer la séquence des écoulements glaciaires, telle qu'elle est illustrée à la figure 8, n'était que pour quelques régions isolées (Veillette et al., 1996; Veillette et al., sous presse). Toutefois il n'a pas été possible de déterminer l'ordre de formation des stries glaciaires situées à l'est de la Moraine d'Harricana et dans les régions cartographiques adjacentes (écoulement n° 3). Malgré la présence de marques indiquant un écoulement vers le sud-ouest (écoulement n° 2) à l'est de l'escarpement de la crête du lac Matagami, aucun erratique d'âge protérozoïque en provenance de ces endroits n'a été signalé à ce jour dans le till ou dans les dépôts fluvioglaciaires de la région cartographique. L'ancienneté nord de la carte de Lac Castagnier correspond à la limite sud d'une vaste zone dépourvue de blocs erratiques d'origine locale. Cette zone, qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres à partir de la baie d'Hudson, Ces erratiques de provenance lointaine se présentent sous forme de blocs dénoués à la surface du sol ou dans des dépôts de plage du Lac Ojibway, mais jamais à l'intérieur du till régional. Des levés géologiques indiquent que la limite sud de la zone dépourvue de blocs erratiques coïncide avec la Moraine de Harricana, de Chamgrenier et de Rochebaucourt (Rompré et Carrier, 1997). Ce carbonate de calcium provient probablement des roches carbonatées de la Plate-forme d'Hudson (Veillette et McClenaghan, 1990).



Figure 13. Bloc erratique de granodiorite du Protérozoïque. Photo: GSC 2004-068

LA SUBMERSION GLACIOLACUSTRE : L'ABITIBI SOUS L'EAU

LE LAC BARLOW-OJIBWAY

Déglaciation et submersion glaciolacustre vont de pair en Abitibi. Situé au sud des Grands Lacs il y a environ 20 000 ans, le front glaciaire s'est retiré vers le nord et a atteint la région de North Bay, en Ontario, il y a environ 10 500 ans (Dyke et Prest, 1987; Veillette et Pullan, 1987; Veillette et al., 1997). Lorsque le front glaciaire a commencé à se retirer, il a libéré de grandes quantités d'eau de fonte qui se sont accumulées dans le sud du Témiscamingue. L'ouverture s'est prolongée vers le nordest pour suivre les environs de Val-d'Or et de là vers le nord-ouest jusque dans la partie sud de la baie James. La Moraine d'Harricana (dont le nom est tiré de la rivière Harricana, qui coule au pied de la moraine) a été mise en place par le glacier (Hardy, 1976), qui a été mis en place entre les deux lobes de glace situés de part et d'autre de cette ouverture en fermeture éclair, dont l'un se retirait vers le nord-ouest et l'autre du complexe interlobaire et l'autre vers le nordest à l'est de celui-ci (écoulement n° 4).

Le lac Barlow-Ojibway (Vincent et Hardy, 1979; Veillette, 1986; Veillette et al., 1997) a été le plus grand lac proglaciaire de l'histoire du bassin hydrographique de la baie James et celui du Saint-Laurent (Antevs et Bryan, 1969). Il a recouvert une superficie de plus de 160 000 km² dans le sud-est de l'Abitibi, une partie des deux bassins, de la région comprise à la baie au sB et dans le bassin du Saint-Laurent, au sud-est. Le lac Barlow-Ojibway a atteint sa profondeur maximale, 9 à 8 000 ans, et est surmonté tour à tour de plusieurs lacs résiduels (Ojibway-Barlow (unité V), de dépôts fluvioglaciaires (unité IV), de dépôts glaciolacustres (unité III) et de dépôts glaciolacustres et fluviaux (unité II), qui ont été mis en place dans le bassin de la région et, tout au sommet, de dépôts glaciolacustres modernes (unité I). Aucune coupe ne montre la succession complète des dépôts glaciaires de ceux du till régional (unité V) et des dépôts de l'Holocène. La stratigraphie de ces dépôts a été établie à partir de l'unité I à IV, mais a été révélée presque uniquement par des forages. Les dépôts décrits dans les basses terres d'Abitibi-Baie-James comme celle des Mines Selbaie (Veillette et al., 1996) ont été corrélés avec la stratigraphie de la figure 14 et ont été regroupés en sédiments anciens (unités I à IV) et sédiments modernes (unité I).

Le dépôt glaciaire le plus ancien (unité I) est formé de sédiments caillouteux et sableux de till subaquatique (Veillette, 1986). Cette unité a été décelée par forage à de rares endroits et a été observée à la surface du sol dans la région de Lac Matagami (Veillette et al., 1996). En raison de sa position stratigraphique, elle est interprétée comme la mise en place d'un till de fond par un glacier qui a recouvert les sédiments lacustres de la baie James et de la baie d'Hudson, qui avaient été déposés dans le lac Barlow-Ojibway. Le till de fond a été mis en place par le