HABITATS DE CERTAINS INSECTES, ACARIDES ET ARAIGNÉES TYPES



PUCE DE L'ÉCUREUIL DE TERRE *Opisocrostis bruneri* (Baker)
FRITILLAIRE POLAIRE *Boloria polaris* (Bdv.)
BLATTE DE PENNSYLVANIE *Parcoblatta pennsylvanica* (Deg.)



ARPENTEUSE *Xanthorhoe baffinensis* McD.
SPHINX DE LA TOMATE *Phlegethontius quinquemaculatus* (Haw.)



PAPILLON MANCINUS *Erebia disa mancinus* (D. and H.)



MOUCHE *Scatophaga frigida* Coq.
PETIT TAUPIN BRUN *Agriotes limosus* (Le C.)
NOCTUELLE *Udea alaskalis* (Gibs.)



PAPILLON DE YOUNG *Erebia youngi* Holl.
VER GRIS À DOS ROUGE *Euxoa ochrogaster* (Guen.)



TIQUE *Ixodes rugosus* Bishopp
ANOPHÈLE *Anopheles freeborni* Ait.
NOCTUELLE *Cylindrifrons succandidalis* (Hulst.)
NOCTUELLE *Tilanio criddellalia* Munr.
SPHINX DU TABAC *Phlegethontius sexta* (Joh.)
ARPENTEUSE *Antepione thisoaria* (Guen.)



SOUS-ESPÈCES DE PAPILLONS DE MONTAGNE COMMUNS *Erebia epipsodea* Butl.
E.e. reminstoni Ehrl. *E.e. hopfingeri* Ehrl. *E.e. epipsodea* Butl. *E.e. freemani* Ehrl. Zones mixtes
LIVRÉE D'AMÉRIQUE *Malacosoma americanum* (F.)



VER GRIS ORTHOGONAL *Agrotis orthogonia* Morr.
ARPENTEUSE *Psychophora sabini* (Curt.)
ARPENTEUSE *Lygris serrataria* B. and McD.



TAUPIN *Agriotes tardus* Brown
LE SOUFRÉ (PAPILLON) *Colias boothi* Curt.
TAUPIN *Agriotes isabellinus* (Mels.)



NOCTUELLE *Udea washingtonalis* Grt.
ARPENTEUSE *Scopula septentrionicola* McD.
HÉMÉROCAMPE *Byrdia groenlandica* Hom.
ARPENTEUSE *Xanthorhoe algidata* (Mach.)



CÈPHE DU BLÉ *Cephus cinctus* Hart.
CARABE *Garabus vielinghoffii* Adams
LIBELLULE *Agrion amatum* (Hag.)



MALMIGNATE *Latrodectes mactans* (F.)
SPHINGIDE *Hemaris gracilis* G. and R.
TAON DU CHEVAL *Tabanus aequilinctus* Becker



ALTISE AMÉRICAINE DU NAVET *Entomoscelis americana* Brown
PAPILLON À QUEUE D'HIRONDELLE *Papilio brevicauda* Saund.



TORDEUSE DES BOURGEONS DE L'ÉPINETTE *Choristoneura fumiferana* (Clem.)



LÉGIONNAIRE *Pseudaletia unipuncta* (Haw.)
Région où on rencontre cet insecte
Région infestée par cet insecte



CRIQUET À AILES CLAIRES *Camnula pellucida* (Scud.)



MOUCHE DE HESSE *Phytophaga destructor* (Say)



PUCE *Xenopsylla cheopis* (Roths.)
SCARABÉE JAPONAIS *Popillia japonica* Newm.
SPONGIEUSE *Porthetria dispar* (L.)
ARPENTEUSE DE BRUCE *Operophtera brumata* (L.)



PYRALE DU MAÏS *Pyrausta nubilalis* (Hbn.)



DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE *Leptinotarsa decemlineata* (Say)

PROJECTION CONIQUE CONFORME DE LAMBERT SÉCANTE AUX PARALLÈLES 49° ET 77°

ÉCHELLE 1:50,000,000 ou 789.1 MILLES au POUCE

500 250 0 500 1000 1500 2000 MILLES
1000 500 0 1000 2000 3000 KILOMÈTRES

ÉTABLI D'APRÈS LES DONNÉES DU SERVICE DES SCIENCES, MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE